

# Зміст

**"Новини садівництва"  
щоквартальний  
науково-виробничий журнал  
№2(72), квітень-червень 2011 р.**

## Засновники:

Укрсадвінпром; Уманський національний університет садівництва; Інститут помології НААНУ; Інститут зрошуваного садівництва НААНУ; Подільська дослідна станція Інституту садівництва НААНУ

Зареєстрований  
Держкомвидавом України  
5.03.1994 р., серія KB 465

Головний редактор:  
доктор с.-г. наук Мельник О.В.

## Редакційна колегія:

доктори с.-г. наук Балабак А.Ф.,  
Бутило А.П., Копилов В.І.,  
Копитко П.Г., Майдебура В.І.,  
Хоменко І.І.; доктор екон.наук  
Рульєв В.А., кандидат біол.наук  
Грицаенюк А.О.; кандидат с.-г. наук  
Ріпамельник В.П.; Білій П.Ф.,  
Рибак А.В., Цимбровська Л.О.

Номер редактували:  
Дрозд О.О., Мелехова І.О.,  
Цимбровська Л.О.  
Комп'ютерний набір: Мельник І.О.  
Проект обкладинки,  
і верстання: Мельник О.В.

**За використання  
матеріалів  
в посилання на "НС"  
обов'язкове**

## Підписка в редакції

Адреса редакції:  
Абон. скринька 543,  
20305, м. Умань-5  
Черкаської області.  
E-mail: noysad@ukr.net  
тел. +38 04744 32326

Підписано до друку 18.VI.2011  
Формат 60x84 1/16  
Обсяг 3 др. арк.

Надруковано в друкарні  
фірми "Есе": 03142, м. Київ,  
пр-т Акад. Вернадського, 34-1

Слово про О.С.Андріенка  
(до 100-річчя від народження).....1

## Розсадництво

Підщепи черешні.....4  
Новий стандарт сажанців.....5

## Агротехніка

Якість сажанців й обрізування черешні.....6  
Обрізування "на ікло".....8  
Проти розтріскування черешень.....13  
Персик по-інтенсивному.....15  
Персикова альтернатива.....22

## За рубежем

Новинки вирощування яблук:  
швейцарський досвід .....25  
Новинки на "Фрутлогістика-2011" .....26

## Нові культури і сорти

Клони яблуні Фуджі і Бреберн .....27  
Сорти у Франції.....29  
Ред Джонапринц.....30  
Клони груші Ноябрська.....32

## Переробка, реалізація

Функціональні розлади плодів зерняткових.....36  
Зберігання черешень.....39

Фото на обкладинці: готовування ділянки до  
закладання саду в Італії (фото О.В.Мельника).

# НОВІ КУЛЬТУРИ | СОРТИ

## НОВІ КАРПАТЬНІ СОРТИ

### КЛОНИ ЯБЛУНІ ФУДЖІ і БРЕБЕРН

Потепління клімату сприяє вирощуванню сортів з тривалим періодом вегетації у середній кліматичній смузі. Вирощування піньостиглих сортів дає також змогу розширити період збору врожаю, що досить важливо за існуючих труднощів з забезпечення сезонними працівниками.

#### *Фуджі*

Піньостиглий японський сорт Фуджі потрапив до Італії у 1990-х роках і набув значного поширення у південному регіоні Європи. Серед чималого числа клонів Фуджі лише окремі придатні для вирощування в умовах середньої кліматичної смуги (Польща), наприклад, Фуджі Кіку 8 і Бені Шогун. Запилювачами для клонів сорту Фуджі можуть бути сорти Голден Делішес, Джонаголд, Гала і Айдаред.

В садах Південного Тиролю (Італія) клон Фуджі Кіку 8 вирощують з 1991р. на площи близько 1000 га, тоді як загальна площа його насаджень в світі – 3500 га. Серед клонів Фуджі саме Кіку 8 вирізняється привабливим забарвленням і винятково солодкими плодами. Яблука Кіку 8 досить важкі й у контейнер їх входить 350 кг, тоді як яблук сорту Джонаголд – 300–310.

Недоліком сорту може бути незначна скловидність м'якушу під час збирання плодів, що зникає протягом кількох тижнів зберігання. Плоди добре зберігаються в звичайному холодильнику, а в регульованому газовому середовищі з ультранизьким вмістом кисню (РГС з УНК) їх можна успішно зберігати навіть до липня-серпня. Яблука тверді, хрусткі, соковиті й солодкі. Дерева середньої сили росту, у плодоношенні вступають рано і щедро плодоносять. Проте для отримання щорічних якісних врожаїв обов'язково проріджують зав'язь.

Популярність сорту зростає з отриманням безвірусної версії Фуджі Кіку Фубракс. Плоди з оздоровлених дерев мають краще забарвлення в усьому об'ємі крони з більш інтенсивним від Кіку 8 рум'янцем.

Бені Шогун (Хейсей Фуджі) – клон, придатний до вирощування в умовах

середньої кліматичної смуги (Польща). Плоди достигають на три тижні раніше від Фуджі, в умовах центральної Польщі останнім часом набувають збиральної стигlosti в останній декаді вересня і придатні до споживання вже під час збирання.

Дерева в перші після садіння роки ростуть досить сильно, надалі ріст слабшає. Для отримання відповідної якості плодів обов'язково проріджують зав'язь. Яблука вирізняються чудовим смаком – солодкі, соковиті, з присмаком ананасу. У звичайному холодильнику плоди зберігають до лютого-березня, а в РГС з УНК – до травня-червня. Під час збирання нерідко спостерігається скловидність м'якушу, яка з часом зникає.

Плоди округлої форми, 75–80 мм у діаметрі. Шкірка матова і гладенька, зеленувато-жовтого основного забарвлення, з оранжево-червоним розмитим рум'янцем.

## **Бреберн**

Бреберн (Леді Гамілтон х Кокс Пепін Оранж) – пізньозимовий сорт яблуні новозеландської селекції. До Західної Європи потрапив досить давно, але нерівномірний ріст і невисока врожайність уражених вірусами дерев не надали йому популярності. Перші оздоровлені від вірусів саджанці вирощено на початку 1990-х в німецькому розсаднику Шнайдера.

Бреберн і його клони найбільш поширені в Німеччині, зокрема в регіоні Боденського озера, де займають близько 8,5% загальної площини насаджень яблуні, яка постійно збільшується.

Дерево помірного росту або досить сильноросле (рекомендовано карликово підщепу), з регулярним щедрим плодоношенням і високою придатністю плодів до тривалого зберігання. Пагони відходять від провідника під прямим кутом, завдяки чому корона формується досить легко. Сорт досить стійкий до парші і середньо стійкий до борошнистої роси. На плодах з молодих дерев може проявлятись підшкірна плямистість.

Добрими запилювачами є Кортланд, Ред Делішес, Гала, Голден делішес, Чемпіон, Елстар, Пінова.

Плоди крупні, дещо приплюснуті, з помітною ребристістю. Принаймні половина шкірки плоду стандартного оздоровленого від вірусів сорту Бреберн покрита смугастим цегляно-оранжево-червоним (теракотовим) рум'янцем, інша частина зелена або зеленувато-жовта. Яблука оптимального терміну збирання солодкі, соковиті й хрусткі. Збиральна стигlosti в умовах середньої кліматичної смуги настає в кінці жовтня – на початку листопада.

Останніми роками у багатьох західноєвропейських розсадниках вирощують саджанці нових клонів цього сорту. Більшість вирощуваних у Німеччині клонів сорту Бреберн походять з Нової Зеландії і продаються під сортовими або торговими назвами. Значна частина клонів ліцензійні, наприклад, Бреберн Хідала Хіллвелл, Лохбу Ред Бреберн, Марірі Ред, Розабел чи Роял Бреберн. Серед неліцензійних – Інфел 6315, Інфел 6458, Бреберн НАК та Бреберн Шнайдера [1]. У Польщі найчастіше пропонують клон Бреберн НАК, зараз проходить реєстрацію темно-червоний клон Бреберн Ред [2].

**Бреберн Нак** набуває поширення в Польщі. Плоди середнього розміру з жовтувато-зеленим основним забарвленням і темно-червоним рум'янцем на близько 2/3 поверхні. Добре зберігаються в звичайному холодильнику до лютого-березня за температури близько 3°C (за нижчої уражуються побутінням м'якушу).

**Маріпі Ред** – темночервоний патентований клон сорту Бреберн, відомий у Новій Зеландії як Еве. Майже вся шкірка з червоним, а на молодих деревах – пурпурівим рум'янцем. Можливе одноразове збирання плодів. Високу якість і вирівняність плодів отримують з безвірусних саджанців та за оптимального терміну збирання врожаю (зазвичай зібрані плоди мають невисоку цукристість).

**Бреберн Ред** – польський клон сорту Бреберн, знайдений в околицях Варшави, досить перспективний для вирощування в умовах середньої кліматичної смуги. Плоди з темночервоним розмитим рум'янцем на понад 80% шкірки, тверді, соковиті, солодкі і зберігаються в звичайному холодильнику до квітня, а в РГС – до червня-липня.

**Бреберн Розабел** – новий новозеландський клон з твердими соковитими плодами з червоним смугастим рум'янцем на більшій частині шкірки. Збиральна стиглість зазвичай настає на початку листопада.

### *Література*

1. Podymniak M. Sporty Fuji i Braeburna dojrzewajace w Polsce // Sad.– 2009.– №3.– P. 20–25.
2. Baab G. Sporty odmiany Braeburn – blogoslawienstwo czy przeklenstwo // Haslo Ogrodnicze.– 2009.– №9.– P.50–53.

*(О.В.Мельник, І.О.Мелехова)*

## **СОРТИ У ФРАНЦІЇ**

**А**нжерською дослідною станцією (Франція) впроваджуються екологічні сорти яблуні: Шантклер, подібний до Голден Делішес, Хоней Кранч, клубний американський сорт, Аріан, з привабливими крупними плодами, Пінк Леді, що має значний успіх у Франції, а також жовтоплідний сорт Тентейшн.

Лідерські позиції утримує Голден Делішес, хоча й з тенденцією до спаду виробництва. Зростає виробництво сорту Гала, утримують позиції Гранні Сміт, Бреберн і Роужес, нарощується виробництво Фуджі і Пінк Леді.

*За матеріалами "Sad nowoczesny", 2007, №4. (І.О.Мелехова)*